

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

HYRAX/ SPINBEUGEL

Ruimte gebrek in de bovenkaak

In een normale relatie tussen boven- en onderkaak staan de kiezen van de bovenkaak buiten de kiezen van de onderkaak. Bij uw kind is dit niet het geval, dit heet een kruisbeet. Om ernstigere afwijkingen te voorkomen is het plaatsen van een hyrax/ spinbeugel in de bovenkaak noodzakelijk. Het wordt vastgezet of gelijmd aan de kiezen.

Midden op het verhemelte zit een schroef die iedere dag 2 keer een kwart slag uitgedraaid moet worden, zover dat het volgende gaatje bereikbaar wordt voor het maken van de volgende kwartslag. Dit uitdraaien kan niet meer dan 28 keer plaats vinden. Zie de telstrook aan de linkerkant van deze instructie, waarop u de vorderingen kunt bijhouden. Door dit uitdraaien van de schroef wordt het verhemelte betrekkelijk snel breder, kunnen er spleten ontstaan tussen de voortanden en gaan de kiezen van de bovenkaak buiten de kiezen van de onderkaak staan. Het doel is dan bereikt. Meestal is het uitdraaien wat pijnlijk, soms wat heviger, maar van korte duur. Een pijnstillers is zelden nodig.

Raadpleeg bij ongerustheid uw orthodontist. Misschien moet het tempo van uitdraaien gewijzigd worden of de mate van uitdraaien. Nadat het eindresultaat is bereikt, dient het apparaat nog 3-6 maanden op zijn plaats te blijven, zodat de nieuwe gebitssituatie zich kan stabiliseren. Daarna zal de orthodontist het uit de mond verwijderen.

Zorgt u voor een goede mondhygiëne, want voedsel blijft makkelijk onder of boven het apparaatje zitten. Een monddouche en fluoride houdende tandpasta zijn sterk aan te bevelen middelen om de mond en tanden gezond te houden.



Hoe beter u uw best doet met de beugel en alle adviezen en instructies opvolgt, des te mooier wordt het eindresultaat en des te sneller bent u van de beugel af.

Het team van Ortho Tan wenst je veel succes!